

Pokyny k dávkování



Eliquis[®]
apixaban

Dávkování přípravku ELIQUIS® je třeba snížit na 2,5 mg 2× denně u pacientů s těmito kritérii:¹




Přechod z léčby warfarinem na přípravek ELIQUIS®




Dávkování u pacientů s renální insuficiencí¹

cca 27 % vylučování ledvinami¹



Stupeň renální insuficience	Bez úpravy dávky
Mírná (CrCl 51–80 ml/min)	<input checked="" type="checkbox"/>
Střední (CrCl 30–50 ml/min)	<input checked="" type="checkbox"/>
Závažná (CrCl 15–29 ml/min)	Přípravek ELIQUIS® 2,5 mg 2× denně
CrCl < 15 ml/min, dialyzovaní pacienti	Přípravek ELIQUIS® se nedoporučuje



V léčbě a prevenci rekurentní HŽT a PE se dávky přípravku ELIQUIS® podle stupně RI neupravují.¹

[†] Je-li indikována prevence recidivy HŽT a PE, je třeba po absolvování 6měsíční léčby přípravkem ELIQUIS® 5 mg 2× denně nebo jiným antikoagulanciem zahájit dávkování 2,5 mg 2× denně.¹

[#] Celkové trvání léčby musí být upraveno individuálně po pečlivém vyhodnocení přínosu léčby oproti riziku krvácení.

Eliquis[®] apixaban

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.
Přípravek je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Před předepsáním se prosím seznamte s úplnou informací o přípravku.
Úplná informace o přípravku je dostupná na <https://www.pfizer.cz/vpois/e-h>.

Tento elektronický materiál je určen pouze pro lékaře
a není určen pro tisk a distribuci.

HŽT – hluboká žilní trombóza, PE – plicní embolie, RI – renální insuficience, CMP – cévní mozková příhoda,
SE – systémová embolie, CrCl – clearance kreatininu, INR – mezinárodní normalizovaný poměr

Reference: 1. Souhrn údajů o přípravku ELIQUIS[®] (apixaban).



Pfizer, spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00, Praha 5, tel.: +420 283 004 111, fax +420 251 610 270, www.pfizer.cz