


# Dávkování NOACs dle funkce ledvin



*Eliquis*<sup>®</sup>  
apixaban


## Dávky NOACs v prevenci CMP/SE u pacientů s NVAF a renálním postižením



\* U edoxabanu byla v porovnání s dobře nastaveným režimem léčby warfarinem pozorována tendence ke snížení účinnosti při zvyšující se clearance kreatininu.<sup>2</sup>

Převzato a upraveno dle SPC Eliquis®, SPC Xarelto®, SPC Lixiana®, SPC Pradaxa®, Heidbuchel et al., Eur Heart J. 2015.<sup>1,4</sup>

## Dávky NOACs v léčbě a prevenci rekurence VTE u pacientů s renálním postižením



Převzato a upraveno dle SPC Eliquis®, SPC Xarelto®, SPC Lixiana®, SPC Pradaxa®.<sup>1-4</sup>

\* Po dokončení 6 měsíců léčby VTE apixabanem 5 mg 2×D nebo jiným antikoagulanciem; † V léčbě a prevenci VTE se dávky apixabanu podle stupně CKD neupravují; ‡ Faktory, které mohou zvyšovat riziko krvácení: např. nízká tělesná hmotnost (< 50 kg), ASA, NSAID (nesteroidní protizánětlivé léky), ezofagitida, gastritida nebo gastroezofageální reflux, klopidogrel;

§ Je-li doporučená dávka po 6měsíční léčbě 10 mg jednou denně, není třeba žádná úprava doporučené dávky; † U pacientů s vysokým rizikem recidivující HŽT/PE je třeba zvážit po 6měsíční léčbě dávku 20 mg 1×D

# Eliquis® apixaban

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.  
Přípravek je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.  
Před předepsáním se prosím seznamte s úplnou informací o přípravku.  
Úplná informace o přípravku je dostupná na <https://www.pfizer.cz/vpois/e-h>.

Tento elektronický materiál je určen pouze pro zdravotnické odborníky  
a není určen pro tisk a distribuci.

**NOACs** – non-vitamin K perorální antagonisté, **CMP/SE** – cévní mozková příhoda/systémová embolie, **NVAF** – nevalvulární fibrilace síní,  
**CrCl** – clearance kreatininu, **SPC** – Souhrn údajů o přípravku, **EHRA** – Evropská asociace pro srdeční rytmus,  
**CKD** – chronické onemocnění ledvin, **VTE** – venózní tromboembolismus, **P-gp** – P-glykoprotein

**Reference:** 1. SPC přípravku Eliquis®, 2. SPC přípravku Xarelto®, 3. SPC přípravku Lixiana®,  
4. SPC přípravku Pradaxa®, 5. Heidbuchel et al., Eur Heart J. 2015



Pfizer, spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00, Praha 5, tel.: +420 283 004 111, fax +420 251 610 270, [www.pfizer.cz](http://www.pfizer.cz)